



用藥指導- Theophylline

商品名：Thoin S.R.M.C / Ventol liq.

中文名：喘克緩釋微粒膠囊/舒喘內服液

成分含量：125 毫克/顆；5.34 毫克/c.c · 60 c.c/瓶

作用：氣喘及支氣管痙攣

用法與劑量

膠囊

- 13 ~ 16 歲孩童：每 12 小時一次，每次 250 毫克
- 9 ~ 12 歲孩童：每 12 小時一次，每次 125 ~ 250 毫克

液劑：一次劑量 125 ~ 250 毫克，每 6 小時給藥一次

9 ~ 16 歲：每天一次，每次 12 毫克/公斤

1 ~ 9 歲：天一次，每次 6 毫克/公斤

未滿 1 歲：每天一次，每次 2 ~ 3 毫克/公斤

醫師/藥師指示服藥方式

| 每天 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | 睡前 | 特別指示 |
|----|----|----|----|----|------|
| 用量 | | | | | |

藥品存放方式

- 存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)、乾燥處，避光貯存。
- 注意避免放在孩童容易取得的地方。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨心悸、顏面潮紅、呼吸急促、胃部不適、頭痛等。

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- 避免同時服用 2 劑或額外劑量或與葡萄柚(汁)併服。
- 請勿將藥分給其他小孩吃。
- 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

| 時間點 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 早上 | | | | | | | |
| 中午 | | | | | | | |
| 晚上 | | | | | | | |
| 睡前 | | | | | | | |

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 3154/5126
中國醫藥大學兒童醫院