



病人安全 一般用藥安全須知

一般用藥須知

若您有下列情況時應當告知醫師或藥師：

- 對藥物、食物或特殊物質曾經有過敏反應或異常反應時。
- 計畫懷孕、有可能懷孕或懷孕。
- 最近數週內曾服用過、及現在服用的其他藥物。
- 有家族遺傳疾病或其他疾病。

服藥前應該注意的事項

- 遵照醫師或藥師指示，於正確時間及正確期間內服藥。
- 應按時服藥，以免延誤病情康復的時間。
- 服藥前應再次閱讀藥名及用藥指示，並注意藥物有效保存期限。
- 若必須同時服用中、西藥時，一定要間隔 2-3 小時，與確認其藥效，以避免藥品交互作用的影響。
- 任何藥品都可能會有副作用或不良反應。應主動詢問及了解服用之藥品有哪些副作用、注意事項及該如何處置。

服用藥品時應該注意的事項：

- 不論中或西藥，服用時應配服溫開水，不宜喝茶、咖啡、可樂或果汁等。
- 藥品服用時不可擅自停藥，隨意增減藥量或改變服用方法。
- 雖然與他人有相同的症狀，也不可以服用別人的藥品或將自己的藥品給予他人服用。
- 手術（包括拔牙）進行前或緊急醫療情況下，應預先告知醫師目前你正在服用的藥品。
- 服藥後若有任何異常反應發生，應儘快與醫師或藥師聯絡。

服藥避免錯誤的方法：

- 服藥前仔細閱讀藥袋標示，若有標示不清楚或不明確者，應詢問醫師或藥師。

- 未用完之藥品應置於原藥袋中，並以原包裝保存，不要撕掉貼在容器上面的標示，以避免混淆。
 - 不同的藥品不要放在同一容器內，以免發生取藥錯誤。
 - 請不要在黑暗中摸索服藥，以避免服錯藥品。
 - 曾經發生用藥不適或副作用者，可以自行記錄下來，作為日後提供醫師處方藥品時的參考。
-

藥品存放注意事項

- 藥品應放置於室內陰涼乾燥的地方，避免直接受熱與陽光曝曬；亦不可放在冰箱或浴室內，以免受潮變質。
 - 為防止小孩發生誤取誤食，藥品應存放於兒童拿取不到的地方或有安全設計的容器瓶中。
 - 不同階段使用的藥品應分開保存，並標示有效保存期限。
 - 過期的藥品，切勿服用。
 - 隨時保有醫院、藥局或急救中心的電話，以備不時之需。
-

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：[\(04\) 22052121](tel:(04)22052121) 分機 3154