



## 蜂巢皮秒雷射PicoSure®

### 蜂巢皮秒雷射PicoSure®

PicoSure蜂巢透鏡755nm皮秒雷射，結合蜂巢瞬效透鏡(Focus lens array)使表皮黑色素細胞因蜂巢透鏡聚焦能量，產生空泡化生物組織反應（臨床稱為LIOB效應），黑色素空泡化作用僅在表皮層，並無直接傷害，刺激深層黑色素細胞，降低反黑率，縮短恢復期。皮秒震盪波傳遞至深層膠原蛋白區，造成膠原蛋白受損，啟動修復訊號，促進生長因子與彈性纖維再生。

### 適應症

- 黑色素
- 皺紋、紋理
- 刺青
- 凹疤

### 禁忌症

- 懷孕或正在計畫懷孕、哺乳婦女、對光有敏感性。
- 曬傷肌膚、長痘痘發炎的肌膚。

### 術後衛教

- 治療後，皮膚短暫接受大量熱能，會感到較乾燥請加強保濕，並冰敷15~20分鐘。
- 少數人於治療後皮膚會有些微紅、微灼熱、搔癢感及局部有小丘疹，這是正常的現象。數分鐘~24小時會漸漸退去，如仍感不適可以視情況冰敷鎮定或是安排回診檢視。

### 術後注意事項

- 避免刺激皮膚：治療後一週內請使用中性溫性潔膚乳來清潔臉部，避免烤箱三溫暖SPA、蒸氣浴、烤箱、去角質、做臉；請勿使用刺激性產品、美白或酸類產品，例如：果酸、A酸、水楊酸、麴酸、高濃度維他命C、酒精、磨砂顆粒產品等（例如：SKII保養品先暫時停用一週）。

- 保濕：皮膚在接受雷射治療後，加強保濕可以讓皮膚在修護上發揮最大的功效，建議使用中性溫和不含香料防腐劑的保濕產品。
- 防曬：減少紫外線的傷害，亦可避免膠原蛋白的流失，建議防曬係數SPF 30以上，且每2~3個小時補擦一次，並多加利用洋傘及遮陽帽。
- 單點深層斑治療或是刺青治療：治療部位會出現灰黑白薄型結痂，請依醫囑搭配藥膏局部塗抹或是使用人工皮，降低不適與促進傷口修復。
- 色素斑及刺青治療：治療後微腫泛紅，可冰敷15~30分鐘，臉部痂皮約5~7天後自然脫落，身體四肢痂皮約1~2週自然脫落，清洗時輕輕擦拭勿摳除。刺青術後如有水泡情形產生，請勿自行擠破，建議返診診視。

### 治療間隔時間

- 通常需治療3次以上（視個人情況而定），再次治療時，需間隔至4~6週。
- 刺青因面積大小、顏色、部位和色料使用不同，需多次治療，治療時間約6~8週並經由醫生建議調整。

---

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡  
電話：[\(04\)22052121](tel:(04)22052121) 分機 2020