



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、 新增 108 年第四次藥委會-新刪藥公告

1. 通過常備共 5 項
2. 通過臨採品項共 3 項
3. 停用品項共 7 項

二、 藥品異動資訊 (P3)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

三、 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P13)

1. 外觀相近，不同成分/不同劑量。

四、 藥物安全警訊 (P15)

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況
 - (1) 血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品安全資訊風險溝通表

一、新增 108 年第四次藥委會-新刪藥公告

1. 通過常備共 5 項 (以商品名字首排序)

商品名	學名規格	適應症	備註
Softa-Man cutaneous solution	45g ethanol, 18g propanol/100ml/1000ml/bot	一般醫護人員之手部殺菌及外科手術 之手部殺菌	
Tambocor	Flecainide acetate 100mg	突發性上室心搏過速、突發性心房纖 維顫動、嚴重心室性心搏過速	
Ulexin for oral suspension	Cephalexin 41.66mg/g, 36g/60ml	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦 膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起 之感染症	
Xofluza	Baloxavir marboxil 20mg tab	適用於治療成人及 12 歲以上兒童之 A 型及 B 型流行性感冒病毒急性感染	自費
Zelnite	Sodium selenite pentahydrate 166.5mcg/ml	用於治療硒缺乏症或用於預防正在接 受靜脈營養病人之硒缺乏症	自費

2. 通過臨採品項共 3 項 (以商品名排序)

商品名	學名規格	適應症	備註
Acarizax 12 SQ- HDM Oral Lyophilisate	Der pte extract (Dermatophagoides pteronyssinus), Der far extract (Dermatophagoides farinae)	治療成人(18-65 歲)塵蟎引起之 過敏性鼻炎	自費
Cleanfleck cream“P.L.”	Fluocinolone, hydroquinone, and tretinoin	臉部中度至重度肝斑之短期治 療，合併各項防曬措施，包括 使用防曬劑	自費
Dymista Nasal Spray	Azelastine hydrochloride 137mg + fluticasone propionate 50mg/ 定量鼻噴劑	本品適用於治療 6 歲以上兒童 及成人之中度至重度過敏性鼻 炎的相關症狀	自費


3. 停用品項共 7 項 (以商品名排序)


****下列藥品不續採購，庫存用罄後停用****


醫令	商品名	學名規格	備註
LCHLOR3	CHG Eye Drops	Chlorhexidine gluconate 0.02% 5mL/Bot	滯用少用，改用 PHMB Eye Drops 0.02% 5mL/Bot
TRILPIV	Edurant	Rilpivirine 25mg/Tab	改用院內其他治療 HIV 藥品
TVARDE2	Levitra	Vardenafil 20mg/Tab	滯用少用，改用院內其他 PDE5 抑制劑
LAMOROL	Loceryl nail lacquer	Amorolfine nail lacquer 5% 3mL/Bot	滯用少用，改用院內其他治療皮膚感染藥品
TMORPH6	MXL	MORphine SULphate 60mg/Cap	改用院內其他鴉片類止痛藥品
TRITONA2	Norvir	Ritonavir 100mg/Tab	改用院內其他治療 HIV 藥品
LILOPRO	VENTAVIS	Iloprost nebuliser sol'n 20mcg/2mL/Amp	滯用少用，改用院內其他治療肺動脈高壓藥品


二、藥品異動資訊

1. 新進品項


日期	109.08.10	
學名/規格	Fluocinolone acetonide 0.01% (0.5mg), Hydroquinone 4%(200mg) and Tretinoin 0.05% (2.5mg) /5g/ tube	
商品名	Cleanfleck cream 5g/Tube 宜斑淨乳膏	
適應症	臉部中度至重度肝斑之短期治療，合併各項防曬措施，包括使用防曬劑。	

日期	109.08.06	
學名/規格	Cefoperazone sodium 1000 mg, Sulbactam sodium 1000 mg/vial.	
商品名	Brosym 2g/Vial 博益欣注射劑	
適應症	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。	
備註	108 年第四次藥委會進用，取代 1g/Vial。	


日期	109.08.11	
學名/規格	Sodium selenite pentahydrate 333 mcg (equivalent to Selenium 100mcg) / 2mL/ Amp	
商品名	Zelnite 2mL/Amp 西寧特	
適應症	用於治療硒缺乏症(Selenium deficiency)，或用於預防正在接受靜脈營養(Parenteral nutrition)病人之硒缺乏症。	

日期	109.08.14	
學名/規格	Flecainide acetate 100mg/Tab	
商品名	Tambocor 100mg/Tab 律博克錠	
適應症	突發性上室心搏過速,突發性心房纖維顫動,嚴重心室性心搏過速	

日期	109.08.18	
學名/規格	Famotidine 20mg/2mL/Amp	
商品名	Famoster 20mg/2mL/Amp 護胃治定注射液	
適應症	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。	
備註	Ranitidine 50mg/2mL/Amp 停用，進用 Famotidine 20mg/2mL/Amp 替代。	

日期	109.08.27	
學名/規格	Ethanol (100%) 450g and propano1 180g /1000mL/Bot	
商品名	Softa-Man cutaneous solution 1000mL/Bot 舒膚邁手部消毒殺菌液	
適應症	一般醫護人員之手部殺菌及外科手術之手部殺菌。	



2. 臨時採購

日期	109.08.11	
學名/規格	Rituximab-abbs 500mg/Vial	
商品名	Truxima 500mg/Vial 安利希瑪注射劑	
適應症	<p>1、非何杰金氏淋巴瘤 (1)用於復發或對化學療法有抗性之低惡度 B-細胞非何杰金氏淋巴瘤。(2)併用 CVP 化學療法用於未經治療之緩性(組織型態為濾泡型) B 細胞非何杰金氏淋巴瘤的病人。(3)用於做為濾泡性淋巴瘤患者對誘導療法產生反應之後的維持治療用藥。 2、慢性淋巴球性白血病 (1)TRUXIMA 適用於與 fludarabine 及 cyclophosphamide 併用，做為 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病(CLL)患者的第一線用藥。(2)TRUXIMA 適用於與化學療法併用，做為復發/頑固性的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病患者之治療用藥。 3、肉芽腫性血管炎(Granulomatosis with Polyangiitis, GPA) (Wegener' s 肉芽腫症)及顯微多發性血管炎(Microscopic Polyangiitis, MPA)：TRUXIMA 與葡萄糖皮質素(glucocorticoids)併用，適用於治療成人之肉芽腫性血管炎(GPA，亦稱為韋格納肉芽腫症)及顯微多發性血管炎(MPA)。</p>	
備註	血液腫瘤科臨採	

日期	109.08.18	
學名/規格	Insulin glargine 300 units and lixisenatide 150mcg/ 3mL/ pen.	
商品名	Soliqua 300IU/150mcg/3mL/Pen 爽胰達注射劑	
適應症	適用於基礎胰島素(每日劑量少於 60 單位)或 lixisenatide 治療時 血糖控制不佳的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為 改善血糖之輔助治療。適用於當 metformin 合併使用另一種口 服降血糖藥或 metformin 合併使用基礎胰島素(每日劑量少於 60 單位)治療時血糖控制不佳的第二型糖尿病成人病人，在飲食與 運動外，做為改善血糖之輔助治療。	
備註	新陳代謝科臨採	

3. 更換廠牌

日期	109.08.14	變更項目	由瑞安廠轉為健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Captopril 25 mg/Tab		
商品名	Captrol 可普妥錠	Cabudan 卡布登錠	
適應症	嚴重高血壓、腎血管性高血壓以及傳統療法無理想效果或發生不良副作用之高血壓症。		
備註	原 Captrol 停產，以健喬信元廠替代。		



日期	109.08.26	變更項目	由賽諾菲廠轉為吉帝廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Gonadorelin 0.1mg/1mL/Amp		
商品名	Relefact	LHRH Ferring	
適應症	Hypogonadism; Diagnosis		
備註	原品項停止供貨，進用其他廠替代。		

日期	109.08.13	變更項目	由賽諾菲廠轉為健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Amiodarone 200mg/Tab		
商品名	Cordarone 臟得樂錠	Adarone 艾達絡錠	
適應症	WOLFF-PARKINSON-WHITE 氏症候群、上室性及心室性心博過速、心房撲動、心房纖維顫動、心室纖維顫動。		
備註	原品項缺藥，進用暫代。		

日期	109.08.27	變更項目	日本製轉為國衛院製
對照	舊	新	
圖片			
學名	B.C.G. VACCINE FREEZE-DRIED		
商品名/規格	Freeze-dried BCG vaccine (0.5mg/amp)	Freeze-dried BCG vaccine (1.5mg/amp)	
適應症	預防結核病		
備註	規格劑量不同。		



4. 包裝異動

日期	109.09.11	變更項目	鋁箔印刷顏色變更
對照	舊	新	
圖片	 無完整背面印刷圖片		
學名/規格	Rivastigmine 4.5 mg/Cap		
商品名	Exelon 憶思能膠囊		
適應症	輕度至中度阿滋海默氏病之失智症。與帕金森氏症相關的輕度至中度失智症。		
備註	藍色印刷字體改為黑色。		

日期	109.09.11	變更項目	鋁箔印刷顏色變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Rivastigmine 1.5 mg/Cap		
商品名	Exelon 憶思能膠囊		
適應症	輕度至中度阿滋海默氏病之失智症。與帕金森氏症相關的輕度至中度失智症。		
備註	藍色印刷字體改為黑色。		

日期	109.09.11	變更項目	排列位置變更及新增條碼
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Montelukast Sodium 10 mg/Tab		
商品名	SINGULAIR 欣流膜衣錠		
適應症	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀(allergic rhinitis)。		

日期	109.09.11	變更項目	裸錠變更為片裝
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ethambutol 400 mg/Tab		
商品名	Ebutol 易復癆		
適應症	結核病		

日期	109.09.11	變更項目	外盒大小及鋁箔印刷 排列變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Alendronic acid 70 mg and Colecalciferol 140 mcg (5600 IU)/ tab		
商品名	Fosamax PLUS 福善美保骨錠		
適應症	停經婦女骨質疏鬆症之治療。治療男性骨質疏鬆症，以增加骨密度。		

三、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相近，不同成分/不同劑量。

<p>圖片</p>		
<p>差異說明</p>	<p>鋁箔背面皆為綠色印刷，字體與條碼樣式排列相近</p>	
<p>學名規格</p>	<p>Cortisone acetate 25mg/Tab</p>	<p>Captopril 25mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>乙酸可體松錠</p>	<p>卡布登錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Cortisone acetate 25mg/Tab</p>	<p>Cabudan 25mg/Tab</p>

<p>圖片</p>		
<p>差異說明</p>	<p>外觀皆為粉紅/藍/白三色為主體之透明安瓿</p>	
<p>學名規格</p>	<p>Vitamin C 100mg/2mL/Amp</p>	<p>Oxytocin 10IU/mL/Amp</p>
<p>中文商品名</p>	<p>美達康注射液</p>	<p>謳速生注射液</p>
<p>商品名</p>	<p>Vitacicol 100mg/2mL/Amp</p>	<p>Oxocin 10IU/mL/Amp</p>

四、藥物安全警訊

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

(1) 血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品安全資訊風險溝通表

2020/7/31 英國醫藥品管理局 (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) 發布關於全身性投予血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品與動脈瘤和動脈剝離風險之安全性資訊。

- i. 近期一份歐盟的評估報告指出，所有全身性投予之血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品可能具促進動脈瘤生成和動脈剝離之風險，此類藥品包含 bevacizumab、vandetanib、cabozantinib、ramucirumab、tivozanib、ponatinib、axitinib、lenvatinib、sorafenib、nintedanib、regorafenib、sunitinib、pazopanib 及 aflibercept。而現有之證據仍不足以證實用於治療眼睛相關疾病之玻璃體內注射給藥產品（如 ranibizumab 和 aflibercept 的玻璃體內注射劑）具有此風險。
- ii. 截至 2018 年 12 月 31 日止，歐盟藥物不良反應資料庫共接獲 660 件來自全球各地疑似使用血管內皮生長因子路徑抑制劑後發生動脈瘤或動脈剝離之案例報告，其中包含致死的案例，主要與主動脈瘤破裂和主動脈剝離相關。回溯通報個案之病史，發現最常被通報的風險因子為高血壓，其他風險因子尚包括糖尿病、高膽固醇血症、高脂血症、主動脈瘤病史、心血管疾病或吸菸等；而主動脈瘤和主動脈剝離較常被通報發生在 65 歲以上之老年人族群。
- iii. 全身性投予血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品導致動脈瘤或動脈剝離之機轉尚不明確，但可能與血管壁受損程度、高血壓或原有高血壓惡化有關，惟目前難以估算其風險大小。
- iv. 考量上述嚴重風險，歐洲已更新所有全身性投予之血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品之仿單以包含動脈瘤和動脈剝離風險，並建議具風險因子（如高血壓）之病人在開始使用此類藥品前應審慎考量相關風險，而正在接受全身性投予此類藥品治療之病人應密切監測並盡可能減少可調控之風險因子（如高血壓和抽菸）。

醫療人員應注意事項：

- i. 不論病人是否患有高血壓，全身性投予血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品都可能有促進動脈瘤生成和動脈剝離的風險。
- ii. 病人使用全身性投予血管內皮生長因子路徑抑制劑後發生動脈瘤或動脈剝離之情形並不常見，但卻有致死的案例，主要與主動脈瘤破裂和主動脈剝離

有關。

- iii. 在開始使用此類藥品於具風險因子之病人前應審慎考量動脈瘤和動脈剝離風險，這些風險因子包含高血壓、動脈瘤病史或家族史、吸菸、糖尿病、冠狀動脈疾病、腦血管或周邊動脈疾病、高脂血症等，其他風險因子尚包含馬凡氏症候群 (Marfan syndrome)、血管型埃勒斯-丹洛斯症候群 (vascular Ehlers-Danlos syndrome)、高安氏動脈炎 (Takayasu arteritis)、巨細胞動脈炎 (giant cell arteritis)、貝賽特氏症 (Behcet's disease) 及使用 fluoroquinolone 類藥品。
- iv. 密切監測正在接受全身性投予此類藥品治療之病人並盡可能減少任何可調控之風險因子 (如高血壓、抽菸等)。
- v. 醫療人員應告知病人使用血管內皮生長因子路徑抑制劑類藥品之風險，並告知病人若用藥期間有任何不適，應尋求醫療協助。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 本院含有全身性投予血管內皮生長因子路徑抑制劑之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IBEVACI3 IBEVACI2	Avastin	Bevacizumab 100mg/4mL/Vial	癌思停注射劑
IBEVACI7	Mvasi	Bevacizumab 100mg/4mL/Vial	艾法施注射液
TCABO61 TCABO6	Cabometyx	Cabozantinib 60mg/Tab	癌必定膜衣錠
TCABO41 TCABO4	Cabometyx	Cabozantinib 40mg/Tab	癌必定膜衣錠
TCABO21 TCABO2	Cabometyx	Cabozantinib 20mg/Tab	癌必定膜衣錠
IRAMUC11 IRAMUC1	Cyramza	Ramucirumab 100mg/Vial	欣銳擇注射劑
TPONAT1	Iclusig	Ponatinib 15mg/Tab	英可欣膜衣錠
TAXITI5	Inlyta	Axitinib 5mg/Tab	抑癌特膜衣錠
TAXITIN	Inlyta	Axitinib 1mg/Tab	抑癌特膜衣錠
TLENV10	Lenvima	Lenvatinib 10 mg/cap	樂衛瑪膠囊
TLENV04	Lenvima	Lenvatinib 4 mg/cap	樂衛瑪膠囊
TSORAFE	Nexavar	Sorafenib 200mg/Tab	蕾莎瓦
TNINTED	Ofev	Nintedanib 150mg/Cap	抑肺纖軟膠囊

TNINTE1	Ofev	Nintedanib 100mg/Cap	抑肺纖軟膠囊
TREGORA2	Stivarga	Regorafenib 40mg/Tab	癌瑞格膜衣錠
TSUNITI	Sutent	Sunitinib 12.5mg/Cap	紓癌特膠囊
TPAZOPA	Votrient	Pazopanib 200mg/Tab	福退癌膜衣錠

- ii. 就醫時應主動告知醫療人員自身病史及用藥史，醫師將進一步評估您的用藥。
- iii. 若服藥後出現任何可能為動脈瘤破裂或動脈剝離之相關徵兆或症狀，例如突然且劇烈的腹痛、胸痛或背痛，請立即尋求醫療協助。
- iv. 若您對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員，切勿於諮詢醫療人員前自行停藥。