



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-13154

藥劑快訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P11)

1. 外觀相似

三、藥物安全警訊 (P12)

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表

- (1) 5 種 Ergot-alkaloid 類成分藥品之中文仿單修訂
- (2) 含 ezetimibe 成分藥品安全資訊風險溝通表
- (3) Opioid 類成分藥品安全資訊風險溝通表

一、藥品異動資訊

1. 新進品項

日期	113.05.07	
學名/規格	Pegfilgrastim 6 mg/0.6mL/Syringe	
商品名	Ziextenzo Solution for Injection 血添佐注射劑	
適應症	適用於非骨髓性癌症病人在接受易引起臨床上有顯著發生率的嗜中性白血球減少症合併發燒之骨髓抑制性抗癌藥物治療時，以降低嗜中性白血球減少症合併發燒為表現之感染發生率。	


日期	113.05.08	
學名/規格	本品由三個腔室軟袋組成，軟袋容量分別為： Amino acid solution with electrolytes 250ml, Glucose 42% 149ml, Lipid emulsion 94ml.	
商品名	SmofKabiven Emulsion for Infusion 493ml 斯莫克必恩中心靜脈輸注液	
適應症	靜脈營養輸注，適用於無法由口腔進食或經腸道獲取足夠營養，或禁止由口腔及腸道進食之成年患者及 2 歲以上兒童。	

2. 臨時採購

日期	113.03.25	
學名/規格	Riociguat 2.5 mg/Tab	
商品名	Adempas Tab 2.5 mg 愛定保肺膜衣錠 2.5 毫克	
適應症	<p>1.慢性血栓栓塞性肺高壓(CTEPH, WHO Group 4)：用於治療無法手術之 CTEPH 成人病患及接受手術治療後仍持續發生或復發之 CTEPH 成人病患，以改善運動能力及改善 WHO 功能層級。 2.肺動脈高血壓(PAH, WHO Group 1)：用於治療 PAH 的成人病患，以改善運動能力、改善 WHO 功能層級並延緩臨床症狀惡化。 說明：「病患接受 riociguat 單一藥物治療或合併使用內皮素受體拮抗劑或前列腺素類藥物均可展現治療效益。試驗有效性的建立主要來自 WHO 功能層級 II 和 III 的病患，以及病因為原發性或遺傳性的 PAH 病患，或與結締組織疾病相關的 PAH 病患。」</p>	
備註	小兒心臟科臨採品項	

日期	113.04.09	
學名/規格	Trastuzumab 150mg/Vial	
商品名	Eirgasun vial 150 mg 益康平凍晶注射劑 150 毫克	
適應症	<p>一、使用於下列 HER2 過度表現或 HER2 基因 amplification 之早期乳癌、轉移性乳癌病人： 1、早期乳癌 (EBC) (1)經外科手術、化學療法(術前或術後)之輔助療法。 (2)以 doxorubicin 與 cyclophosphamide 治療，再合併 paclitaxel 或 docetaxel 之輔助療法。 (3)與 docetaxel 及 carboplatin 併用之輔助療法。 (4)術前與化學療法併用和術後之輔助療法使用於治療局部晚期(包括炎症)乳癌或腫瘤(直徑>2 厘米)。 2、轉移性乳癌(MBC) (1)單獨使用於曾接受過一次(含)以上化學療法之轉移性乳癌；除非病人不適合使用 anthracycline 或 taxane，否則先前之化學治療應至少包括 anthracycline 或 taxane。使用於荷爾蒙療法失敗之荷爾蒙受體陽性之病人，除非病人不適用荷爾蒙療法。 (2)與 paclitaxel 或 docetaxel 併用於未曾接受過化學療法之轉移性乳癌。 (3)與芳香環酶抑制劑併用於荷爾蒙受體陽性之轉移性乳癌。 二、轉移性胃癌(mGC)：合併 capecitabine (或 5-fluorouracil)及 cisplatin 適用於未曾接受過化學治療之 HER2 過度表現轉移性胃腺癌(或胃食道接合處腺癌)的治療。</p>	
備註	乳房外科臨採藥品	

日期	113.04.11	
學名/規格	Anifrolumab 300mg/2mL/Vial	
商品名	Saphnelo 150 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 莎芙諾注射劑 150 毫克/毫升	
適應症	與標準治療併用，適用於在標準治療下仍為中度至重度的自體免疫抗體陽性之全身性紅斑性狼瘡成年病人。使用限制：目前尚未有臨床試驗顯示本品用於嚴重狼瘡腎炎或嚴重中樞神經系統狼瘡之療效與安全性。	
備註	風濕免疫科臨採藥品	

日期	113.04.16	
學名/規格	Dupilumab 200mg/1.14mL/syringe	
商品名	Dupixent injection 200mg 杜避炎注射劑 200 毫克	
適應症	1.異位性皮膚炎：可用於治療患有中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人病人及 6 個月以上的兒童病人。可併用或不併用局部皮質類固醇治療。 2. 氣喘：可作為 6 歲(含)以上患有嗜酸性白血球表現型或口服皮質類固醇依賴型之中度至重度氣喘病人，在已接受中劑量或高劑量吸入性皮質類固醇(ICS)及第 2 種控制藥物（如，LABA, LTRA, LAMA 或 methylxanthines）治療，或單獨接受高劑量 ICS 治療，仍有氣喘控制不佳現象時的附加維持治療(add-on maintenance therapy)。 3.慢性鼻竇炎合併鼻息肉：可作為患有慢性鼻竇炎合併鼻息肉(CRSwNP)之成人病人在鼻內皮質類固醇治療下仍控制不佳的附加維持治療(add-on maintenance therapy)。	
備註	皮膚科臨採藥品	

日期	113.04.17	
學名/規格	Tafamidis 61mg/Cap	
商品名	Vyndamax soft Capsules 61 mg 維萬心軟膠囊 61 毫克	
適應症	用於治療成人野生型或遺傳性的轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉著症造成之心肌病變(transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy)，以降低總死亡率和心血管疾病住院。	
備註	心臟內科臨採品項	


日期	113.04.22	
學名/規格	Emicizumab 150mg/mL 0.4mL/Vial	
商品名	Hemlibra SC Inj 150 mg/mL 血甯博皮下注射劑 150 毫克/毫升	
適應症	適用於帶有或未帶有第八凝血因子抗體的 A 型血友病（先天性第八凝血因子缺乏）病人之出血事件常規性預防。	
備註	臨採限培德醫院病人使用	

日期	113.05.13	
學名/規格	Risankizuma 360mg/2.4mL/Syringe	
商品名	SKYRIZI 150 mg/ml solution for injection 喜開悅 150 mg/ml 注射劑	
適應症	<p>1. 乾癬：適合接受全身性治療的中度至重度斑塊性乾癬成人病人。 2. 乾癬性關節炎：單獨使用或與傳統疾病緩解型抗風濕藥物(cDMARD)合併使用，適用於治療對疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)療效不佳或無法耐受之活動性乾癬性關節炎成人病人。 3. 適用於治療 16 歲以上之中度至重度克隆氏症：對傳統治療或生物製劑治療反應不佳、失去反應、無法耐受、或不適合接受上述治療之病人。 4. 掌蹠膿皰症：適用於治療對傳統療法未能產生有效反應或無法耐受的中等至重度掌蹠膿皰症成人病人。</p>	
備註	消化系胃腸科臨採藥品	

3. 更換廠牌

日期	113.05.03	變更項目	變同廠不同規格
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Prasugrel 5mg/Tab	Prasugrel 20mg/Tab	
商品名	Efient Tab 抑凝安膜衣錠		
適應症	適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。		
備註	原品項停產，進用 20mg 替代。		

日期	113.05.10	變更項目	變同廠專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Brigatinib 90 mg/Tab		
商品名	Alunbrig tablets 90mg 癌能畢膜衣錠 90 毫克	Alunbrig film-coated tablets	
適應症	適用於治療 ALK 陽性的晚期非小細胞肺癌(NSCLC)病人。		
備註	原品項缺貨進用暫代。		

日期	113.05.13	變更項目	同藥理暫代
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Methimazole 5 mg/Tab	Carbimazole 10 mg/Tab	
商品名	Methimazole 甲硫嗎唑錠	Carbizo 抗泌腫錠	
適應症	甲狀腺機能亢進症。	甲狀腺機能亢進，甲狀腺中毒症，白色陀氏病，甲狀腺手術前治療基礎新陳代謝過高。	
備註	原品項缺貨，進用暫代。		

日期	113.05.15	變更項目	變同廠不同規格
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Sinbaby Lotion 120 g/Bot, each g contains: Zinc Oxide 100 mg Diphenhydramine 5 mg Dibucaine HCl 1.5 mg	Sinbaby Lotion 40g/Bot, each g contains: Zinc Oxide 100mg Diphenhydramine 5mg Dibucaine HCl 1.5mg	
商品名	Sinbaby Lotion 金貝比嬰兒洗劑		
適應症	緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。		
備註	原品項停產退出健保，另引進自費品項替代。		


日期	113.05.21		變更項目	原強生廠變應元廠
對照	舊		新	
圖片	 <p>The image shows two blister packs of Folacin F.C Tab. The left pack is partially opened, showing yellow tablets. The right pack is closed. A red box highlights two tablets. The text 'CMUH' is visible in the bottom right corner.</p>		 <p>The image shows two blister packs of Folic acid tablets. The left pack is partially opened, showing yellow tablets. The right pack is closed. A red box highlights two tablets. A ruler is visible at the bottom for scale. The text 'CMUH' is visible in the bottom left corner.</p>	
學名/規格	Folic acid 5mg/Tab			
商品名	Folacin F.C Tab 葉酸膜衣錠	Folic acid tablets “應元”葉酸錠		
適應症	惡性貧血、妊孕性貧血、小兒 巨大紅血球貧血及骨髓增生或 衰退引起之貧血。	巨細胞性貧血、嬰兒巨初紅血球 性貧血、孕婦惡性貧血。		
備註	原品項缺藥，進用暫代。			

4. 包裝異動

日期	113.04.22	變更項目	瓶裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Lactulose 666 mg /mL, 300 ml/Bot.		
商品名	Lactul syrup 樂多糖漿		
適應症	患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷		

日期	113.04.29	變更項目	片裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Topiramate 25mg/Tab		
商品名	Topamax 妥泰膜衣錠		
適應症	用於成人及兩歲以上兒童局部癲癇或併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，用於 PARTIAL ONSET SEIZURE 病患之單一藥物治療、預防偏頭痛。		

日期	113.05.13	變更項目	片裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Flunitrazepam 2 mg/Tab		
商品名	Fallep 服爾眠錠		
適應症	失眠		

日期	113.05.13	變更項目	片裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	NINTEdanib ethanesulfonate 100mg/Cap		
商品名	OFEV Cap 抑肺纖軟膠囊		
適應症	1、特發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis)：適用於治療特發性肺纖維化(IPF)。 2、與全身性硬化症有關之間質性肺病：適用於減緩與全身性硬化症有關之間質性肺病(SSc-ILD)病人的肺功能下降速度。 3、慢性漸進性纖維化間質性肺病(PF-ILD)。		

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>HydroCortisone(舒汝固體膚) 100mg/Vial</p>	<p>Alprostadiol (PGE1) 20mcg/Vial</p>
<p>中文商品名</p>	<p>舒汝固體膚滅菌注射粉劑</p>	<p>保脈暢注射</p>
<p>商品名</p>	<p>Solu-cortef 100mg/Vial</p>	<p>Promostan (PGE1) 20mcg/Vial</p>

三、藥物安全警訊

1. TFDA 藥品安全資訊

(1) 5 種 Ergot-alkaloid 類成分藥品之中文仿單修訂

含 ergotamine 及 dihydroergotamine 成分藥品：

- i. 「加框警語」（應包含下列內容）：合併使用商品名(或成分名)及強效 CYP3A4 抑制劑，如 ceritinib、cobicistat、protease inhibitor (如 ritonavir)、azole 類抗黴菌藥(如 itraconazole、posaconazole、voriconazole)、巨環類抗生素(如 erythromycin、clarithromycin) 可能會引起罕見但嚴重，甚至危及生命之顱部及/或周邊缺血，故不應合併商品名(或成分名)及強效 CYP3A4 抑制劑使用。
- ii. 「警語及注意事項」段落(應包含下列內容)：**強效 CYP3A4 抑制劑**
 - (a) 合併使用商品名(或成分名)及強效 CYP3A4 抑制劑可能會引起罕見但嚴重，甚至危及生命之顱部及/或周邊缺血，強效 CYP3A4 抑制劑包含如 ceritinib、cobicistat、protease inhibitor (如 ritonavir)、azole 類抗黴菌藥(如 itraconazole、posaconazole、voriconazole)、巨環類抗生素(如 erythromycin、clarithromycin)。
 - (b) CYP3A4 抑制劑將增加商品名(或成分名)之血中濃度，提升血管攣縮以致顱部及/或周邊缺血之風險。
- iii. 「交互作用」段落（應包含下列內容）：**強效 CYP3A4 抑制劑**

強效 CYP3A4 抑制劑將增加商品名(或成分名)之血中濃度，提升血管攣縮以致顱部及/或周邊缺血之風險。本品與中效 CYP3A4 抑制劑合併使用亦具有導致血管攣縮之潛在風險，當處方商品名(或成分名)時，處方者應考量合併用藥對於 CYP3A4 酵素之影響。

含 ergometrine (ergonovine) 及 methylergometrine (methylergonovine) 成分藥品

- i. 「警語及注意事項」段落（應包含下列內容）：**強效 CYP3A4 抑制劑**

合併麥角生物鹼類藥品(如 ergotamine、dihydroergotamine)與強效 CYP3A4 抑制劑可能會引起罕見但嚴重之血管攣縮導致顱部及/或周邊缺血。雖然目前尚無商品名(或成分名)與強效 CYP3A4 抑制劑併用發生上述不良反應之案例報告，仍應避免商品名(或成分名)與強效 CYP3A4 抑制劑併用。強效 CYP3A4 抑制劑包含如 ceritinib、cobicistat、protease inhibitor (如 ritonavir)、azole 類抗黴菌藥(如

itraconazole、posaconazole、voriconazole)、巨環類抗生素(如 erythromycin、clarithromycin)。

- ii. 「交互作用」段落(應包含下列內容)：**CYP3A4 抑制劑**
強效 CYP3A4 抑制劑將增加麥角生物鹼類藥品(如 ergotamine、dihydroergotamine)之血中濃度，提升血管攣縮以致顱部及/或周邊缺血之風險。雖然目前尚無商品名(或成分名)與強效 CYP3A4 抑制劑併用風險之研究，仍應避免商品名(或成分名)與強效 CYP3A4 抑制劑併用(詳警語及注意事項處)。同時，與中效 CYP3A4 抑制劑併用時應謹慎使用；處方商品名(或成分名)時，處方者應考量合併用藥對於 CYP3A4 酵素之影響。

含 bromocriptine 成分藥品

- i. 「交互作用」段落(應包含下列內容)：**CYP3A4 抑制劑**
- (a) 商品名(或成分名)廣泛經由 CYP3A4 酵素代謝，應謹慎與強效 CYP3A4 抑制劑併用，如 ceritinib、cobicistat、protease inhibitor(如 ritonavir)、azole 類抗黴菌藥(如 itraconazole、posaconazole、voriconazole)、巨環類抗生素(如 erythromycin、clarithromycin)。
- (b) 依據藥物動力學研究，合併使用 erythromycin 與 bromocriptine 將使 bromocriptine 之平均血中濃度曲線下面積及最高血中濃度分別增加 3.7 倍及 4.6 倍*。*Nelson, M. et. al. (1990).
Pharmacokinetic evaluation of erythromycin and caffeine administered with bromocriptine. Clin Pharmacol Ther; 47(6):694-7.

(2) 含 ezetimibe 成分藥品安全資訊風險溝通表

2024/3/27 加拿大 Health Canada (HC) 發布致醫療人員風險溝通函，ezetimibe 可能導致藥物性肝損傷 (drug-induced liver injury, DILI) 和嚴重皮膚不良反應 (severe cutaneous adverse reaction, SCARs)，包含史蒂文生氏強生症候群 (Stevens-Johnson syndrome, SJS)、毒性表皮壞死溶解症 (toxic epidermal necrolysis, TEN) 和藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀 (drug reaction with eosinophilic and systemic symptoms, DRESS)。

- i. 許可證持有商評估全球安全性數據與科學文獻，發現 42 件使用 ezetimibe 後發生 DILI 之上市後案例，包含 1 件與單獨使用 ezetimibe 治療有關的加拿大案例，故有充分證據顯示使用 ezetimibe 單一療法與發生 DILI 之間具有因果關聯，因此建議即使單用 ezetimibe 仍應考量於開始與治療期間監測肝功能。
- ii. 此次安全性評估亦發現使用 ezetimibe 後發生罕見之 SCARs 案例，且有充分證據顯示部分案例的 SJS、TEN 和 DRESS 不良反應與使用 ezetimibe 之間具有合理可能的因果關聯。
- iii. 加拿大 HC 已更新含 ezetimibe 成分藥品仿單，包含 DILI 和 SCARs 相關風險警語及特殊警語等安全性資訊。

食品藥物管理署說明：

- i. 我國目前核准含 ezetimibe 成分藥品許可證單/複方共 19 張，其中文仿單於「警語/注意事項」段刊載併用 statin 類藥品可能發生氨基轉移酶持續升高的情形，在治療初期應做肝功能檢查；於「副作用/不良反應」段刊載 ALT 及/或 AST 值上升、gamma-麩胺醯轉移酶增加、肝功能檢驗異常；於「上市後經驗」處刊載肝炎、DILI、SCARs，包括 SJS、TEN、DRESS 等安全性資訊，惟未於「特殊警語」處刊載 DILI、SCARs 等相關安全資訊。
- ii. 本署現正評估是否針對該類藥品採取進一步風險管控措施

醫療人員應注意事項：

- i. 不論 ezetimibe 為單獨使用抑或與 statin 或 fenofibrate 併用，於病人開始 ezetimibe 治療時，都應考慮執行肝功能檢測，並於後續視臨床需求進行監測。
- ii. 應指導病人肝損傷相關初期症狀，並於症狀出現時需立即告知醫療人員；若懷疑有肝損傷情形，應檢測並評估病人的肝功能情形。
- iii. 應指導病人 SCARs 相關初期症狀，並於症狀出現時應停用 ezetimibe 並立即尋求醫療協助。

病人應注意事項：

- i. 若您具有肝臟相關病史，就醫時應主動告知醫療人員，醫師將審慎評估您使用藥品的風險效益。
- ii. 若您於用藥期間發生疑似肝損傷的症狀，如嚴重腹痛(特別是在右上側肋骨下方的位置)、深色尿液、全身發癢、嚴重噁心/嘔吐、白色糞便、皮膚或眼白泛黃，應立即尋求醫療協助。
- iii. 若您出現疑似嚴重皮膚不良反應的徵兆或症狀，如皮膚嚴重脫屑及腫脹，皮膚、口腔、眼睛、生殖器起水泡；或有粉紅色斑點之皮疹，尤其在手掌或腳底板，亦可能起水泡；或出現類流感症狀如發燒、寒顫、肌肉痠痛等，應立即停用 ezetimibe 並尋求醫療協助。
- iv. 若對於用藥有任何的疑慮或疑問，請諮詢醫療人員。

本院含 ezetimibe 成份之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TEZETIM	Ezetrol	Ezetimibe 10mg/Tab	怡妥錠
TATOZET	Atozet(複方)	Ezetimibe 10 mg / Atorvastatin 20 mg Tab	優泰脂膜衣錠

(3) Opioid 類成分藥品安全資訊風險溝通表

瑞士 Swissmedic 於 113 年 4 月 3 日發布警訊說明，將更新國內所有鴉片類藥品仿單之「加框警語」，以包含潛在之藥品依賴性與濫用性、呼吸抑制、與中樞神經抑制劑併用、藥品意外暴露、新生兒鴉片類藥品戒斷症候群等風險之安全性資訊。

因研究顯示過去 20 年瑞士鴉片類藥品之處方量與中毒案例顯著增加，故瑞士藥物主管機關 Swissmedic 決議將於仿單之「加框警語」處增列以下風險：

- i. **藥品依賴性與潛在的濫用風險**：重複使用鴉片類藥品可能導致耐受性和生理和/或心理性依賴。
- ii. **呼吸抑制**：使用鴉片類藥品可能有臨床顯著之呼吸抑制風險。
- iii. **與中樞神經抑制劑併用**：鴉片類藥品與 benzodiazepines 或其他中樞神經抑制劑併用時，可能導致重度鎮靜、呼吸抑制、昏迷和死亡。
- iv. **藥品意外暴露**：意外攝入鴉片類藥品(尤其是兒童)，可能造成藥品過量而致命。
- v. **新生兒鴉片類藥品戒斷症候群**：懷孕期間長期使用鴉片類藥品可能導致新生兒鴉片類藥品戒斷症候群，甚至危及生命。

食品藥物管理署說明：

- i. 我國核准 opioid 類藥品共 264 張，成分包含 alfentanil、buprenorphine、butorphanol、codeine、fentanyl、hydromorphone、methadone、morphine、nalbuphine、oxycodone、pethidine、remifentanil、sufentanil、tramadol 等，其中文仿單針對有關藥品依賴性與濫用性、呼吸抑制、與中樞神經抑制劑併用、藥品意外暴露、新生兒鴉片類藥品戒斷症候群等風險之安全性資訊，於各成分間刊載情形不一。
- ii. 本署現正評估是否針對該類藥品採取進一步風險管控措施。

醫療人員應注意事項：

- i. 鴉片類藥品具有成癮、濫用與不當使用的風險，可能導致用藥過量和死亡。於開立處方前，請評估每位病人的風險，並定期追蹤病人是否出現這類行為和狀況。
- ii. 在使用鴉片類藥品期間可能發生嚴重或致命的呼吸抑制，且此風險在開始治療或調升劑量時最為顯著。建議密切監測病人是否出現相關症狀，特別是在給藥後 24-72 小時內。
- iii. 鴉片類與 benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑(包括酒精)併用，可能導致重度鎮靜、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果或不適用時，方可考慮併用，且建議使用最低有效劑量及最短治療時間，並監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

- iv. 誤用鴉片類藥品可能有藥品過量而致死的風險，尤其是兒童。應告知病人和其照護者有關兒童不慎使用鴉片類藥品的風險及妥善保管藥品之重要性。
- v. 懷孕時長期使用鴉片類藥品，可能導致新生兒發生鴉片類藥品戒斷症候群，若未及時發現和治療可能危及新生兒生命。若孕婦需長期使用鴉片類藥品，應向病人說明相關風險並給予新生兒適當治療。

病人應注意事項：

- i. 鴉片類藥品即使在正確使用的情況下仍有發生嚴重不良反應之風險，如果誤用或濫用，更可能導致成癮、用藥過量或死亡，故臨床上使用該類藥品，須由醫師審慎評估其治療效益及風險。若您正在使用鴉片類藥品，就醫時應告知醫療人員。
- ii. 請依照醫囑用藥，切勿使用超出醫生開立給您的劑量、擅自增加頻次或延長用藥天數，否則可能導致嚴重副作用。
- iii. 如果您在用藥期間出現疑似呼吸抑制的症狀，如呼吸變慢、變淺或感到呼吸困難，應立即就醫。
- iv. 鴉片類藥品與酒精、安眠藥或其他鎮靜劑併用可能增加嚴重不良反應的風險，如果您需要使用安眠藥或其他鎮靜劑，請於就醫時告知您的醫師；倘用藥期間出現不適症狀，應立即就醫。
- v. 即使只是意外誤用一劑鴉片類藥品，仍可能達到致命的劑量，尤其於兒童，故應將藥品妥善保管，置於兒童無法接觸之位置；若發生誤用的情形，應立即送醫處置。
- vi. 懷孕期間長期使用鴉片類藥品可能導致新生兒出現戒斷症狀，如果您已經懷孕或計畫懷孕，請告知您的醫師。

本院含 Opioid 類成份之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TBUPREN	Temgesic	Buprenorphine SL 0.2mg/Tab	丁基原啡因舌下錠
LBUTORP	Butaro	Butorphanol 10mg/mL 2.5mL/Bot	全妥噴鼻液
TFENTA1	Fentora	Fentanyl 100mcg/buccal Tab	吩妥拉口頰錠
IFENT3	FENTAnyl	FENTAnyl 10mL/Amp "PPCD" 0.05mg/mL	吩坦尼注射液
TFENTAN	Painkyl	Fentanyl 200mcg/buccal films	平舒疼口頰溶片
LFENT50	Fentanyl	FENTANYL 50mcg/hr 5mg/Patch	吩坦尼穿皮貼片劑
IFENTAN	Fentanyl	Fentanyl(0.05mg/mL) 2mL/Amp	吩坦尼注射劑
LFEN12.5	DUROGESIC	Fentanyl(12mcg/h) 2.1mg/Patch	多瑞喜穿皮貼片劑
LFENT2.5	Fentanyl	Fentanyl(25mcg/hr) 2.5mg/Patch	吩坦尼穿皮貼片劑
IDEMER1	Pethidine	Meperidine 50mg/mL/Amp	鹽酸配西汀注射液
IMORPH	Morphine	Morphine HCl 10mg/1mL/Amp	鹽酸嗎啡注射液

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IMORP2	MORPHINE	MORPHINE HCl 20mg/1mL/Amp	鹽酸嗎啡注射液
TMORPH2	Morphine	Morphine Sulfate 15mg/Tab	硫酸嗎啡錠
TNNBMST	MORPHINE	MORPHINE SULFATE 30mg/Tab	硫酸嗎啡長效膜衣錠
INALBUP	BAIN	Nalbuphine 10mg/mL/Amp	芯奔注射液
INALBU15	Naldebain	Nalbuphine 150mg/2mL/Vial	納疼解長效注射液
TOXYCO2	OxyContin	Oxycodone HCL 20mg/Tab	疼始康定持續藥效錠
TOXYCO5	OxyNorm	OXYCODONE HCL 5mg/Cap	奧諾美速效膠囊
TTRAMAD	Muaction	Tramadol SR 100mg/Tab	妙而通持續釋放錠
TUTRAPH	Utraphen	Utraphen 37.5/325 mg/Tab(複方)	立除痛膜衣錠