



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

藥劑快訊

發行人：周德陽

總編輯：鄭奕帝

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-13154

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

二、預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P9)

1. 外觀相似
2. 名稱相似

三、藥物安全警訊 (P11)

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表
 - (1) Opioid 類成分止痛藥品安全資訊風險溝通表
 - (2) 含 mefenamic acid 成分和 trimethoprim/sulfamethoxazole 複方成分止痛藥品安全資訊風險溝通表

一、藥品異動資訊

1. 新進品項

日期	114.10.31	
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	
商品名	Vaxigrip 菲流達三價流感疫苗	
適應症	適用於 6 個月以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之 A 型與 B 型流感病毒所引起的流感。	


日期	114.10.29	
學名/規格	Each mL contains: 50 μg latanoprost and timolol maleate 6.8 mg (相當於 timolol 5 mg)。	
商品名	Xalacom Eye Drops 複方舒而坦眼藥水	
適應症	開放性青光眼及高眼壓症，且對局部 β -BLOCKER 治療無效時。	

日期	114.11.07	
學名/規格	Vadadustat 300mg/Tab	
商品名	Vafseo Tablet 衛復守錠劑	
適應症	治療透析成人病人因慢性腎臟疾病導致之貧血。	

日期	114.11.12
學名/規格	Aflibercept 114.3mg/mL 0.07mL/Vial
商品名	Eylea solution for injection 采視明瓶裝注射液
適應症	血管新生型（溼性）年齡相關性黃斑部退化病變。 糖尿病黃斑部水腫(DME)所導致的視力損害。



日期	114.11.17
學名/規格	Hyaluronic acid sodium 60mg/6mL/Syringe
商品名	Suplasyn 1-shot sterile sodium hyaluronate solution 速普新單針關節內注射劑
適應症	用於退化性膝關節炎之症狀治療



日期	114.11.17
學名/規格	Each tab contains: Ezetimibe 10 mg and Rosuvastatin 20 mg.
商品名	Cretrol Tab. 10/20 mg 脂瑞妥錠 10/20 毫克
適應症	原發性高膽固醇血症



日期	114.11.18
學名/規格	Sildenafil 50mg/films
商品名	Viagra orally disintegrating films 威而鋼口溶膜
適應症	成年男性勃起功能障礙



日期	114.11.18
學名/規格	Each Tab contains: Sitagliptin phosphate 50 mg + Metformin HCL 500 mg.
商品名	Janumet film-coated tab 捷糖穩膜衣錠
適應症	適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：已在接受 sitagliptin 和 metformin 合併治療者；或僅使用 sitagliptin 和 metformin 但控制不佳者；或已使用 metformin 與 sulfonylurea 合併治療，但控制不佳者；或已使用 metformin 與 PPAR 鴉促進劑合併治療，但控制不佳者；或已使用 metformin 與胰島素合併治療，但控制不佳者。



2. 臨時採購

日期	114.11.03
學名/規格	Semaglutide 1 mg/Dose, 4 Doses/pre-filled pen
商品名	Wegovy 1 mg solution for injection in pre-filled pen (FlexTouch) 週纖達諾特筆 1 毫克
適應症	肥胖與過重之體重控制 1、做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 為 ≥ 30 kg/m ² (肥胖)，或 ≥ 27 kg/m ² 至 <30 kg/m ² (過重)且至少患有一項體重相關共病，例如血糖異常 (糖尿病前期或第二型糖尿病)、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸中止或心血管疾病。 2、做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為 12 歲以上的青少年，合併肥胖以及體重超過 60 kg。以 2.4mg 或最高耐受劑量治療 12 週後，若青少年病人的身體質量指數 (BMI) 並未下降至少 5%，應停止本品治療並重新評估病人狀況。 3、用於具有心血管疾病且身體質量指數(BMI) ≥ 27 kg/m ² 的成人病人，降低發生重大心血管不良事件(心血管疾病死亡、非致命心肌梗塞、非致命中風)的風險。 4、用於正常收縮分率之心臟衰竭(HFpEF)且 BMI ≥ 30 kg/m ² 的成人病人，改善心臟衰竭症狀與其有關的身體日常活動限制，並降低心臟衰竭住院的風險。
備註	家醫科臨採品項

日期	114.11.03	
學名/規格	Semaglutide 2.4 mg/Dose, 4 Doses/pre-filled pen	
商品名	Wegovy 2.4 mg solution for injection in pre-filled pen (FlexTouch) 週纖達諾特筆 2.4 毫克	
適應症	肥胖與過重之體重控制 1、做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 為 ≥ 30 kg/m ² (肥胖)，或 ≥ 27 kg/m ² 至 <30 kg/m ² (過重)且至少患有一項體重相關共病，例如血糖異常 (糖尿病前期或第二型糖尿病)、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸中止或心血管疾病。 2、做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為 12 歲以上的青少年，合併肥胖以及體重超過 60 kg。以 2.4mg 或最高耐受劑量治療 12 週後，若青少年病人的身體質量指數 (BMI) 並未下降至少 5%，應停止本品治療並重新評估病人狀況。 3、用於具有心血管疾病且身體質量指數(BMI) ≥ 27 kg/m ² 的成人病人，降低發生重大心血管不良事件(心血管疾病死亡、非致命心肌梗塞、非致命中風)的風險。 4、用於正常收縮分率之心臟衰竭(HFpEF)且 BMI ≥ 30 kg/m ² 的成人病人，改善心臟衰竭症狀與其有關的身體日常活動限制，並降低心臟衰竭住院的風險。	
備註	家醫科臨採品項	


日期	114.11.19	
學名/規格	Asciminib 40mg/Tab	
商品名	Scemblix Film-Coated Tablets 欣覓力膜衣錠	
適應症	1、治療新診斷的慢性期費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病(Ph+ CML-CP)成人病人。2、治療曾接受酪胺酸激酶抑制劑治療的慢性期費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病(Ph+ CML-CP)成人病人。3、治療慢性期費城染色體陽性且帶有 T315I 突變之慢性骨髓性白血病(Ph+ CML-CP with T315I mutation)成人病人。	
備註	血腫科臨採品項	


日期	114.11.21	
學名/規格	Paricalcitol 5mcg/mL/Amp	
商品名	Paricalcitol solution for injection 一成優腎注射液	
適應症	使用於伴隨慢性腎功能衰竭(慢性腎臟疾病第五期)的次發性副甲狀腺機能亢進的預防與治療。	
備註	腎臟科臨採品項	

3. 更換廠牌

日期	114.10.30	變更項目	羅得廠變健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Sertraline 50 mg/Tab		
商品名	Zapline Film Coated Tablet 憂必晴膜衣錠	Purtraline Film Coated Tablet 克憂寧膜衣錠	
適應症	鬱症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群(PTSD)及社交恐懼症及經前不悅症(PMDD Premenstrual Dysphoric Disorder)。		
備註	原品項缺藥暫代		

4. 包裝異動

日期	114.11.07	變更項目	瓶身標籤印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	組成: Amino acid 8g, Glucose 16g, Heparin 80unit.		
商品名	stock (10% glucose) 160mL/Bot		
適應症	Nutritional Supplement		

日期	114.11.10	變更項目	片裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Agomelatine 25mg/Tab		
商品名	Valdoxan film-coated tablets 煩多閃膜衣錠		
適應症	治療鬱症及廣泛性焦慮症之成人病人。		

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相似

圖片	
學名規格	Semaglutide 1mg/Dose 4Doses/syr.
中文商品名	週纖達諾特筆
商品名	Wegovy 1mg/Dose 4Doses/syr.

2. 名稱相似

圖片		
學名規格	Latanoprost oph. 0.005% 2.5mL/Bot	Xalacom eye drops 2.5mL/Bot(複方)
中文商品名	舒而坦眼藥水	複方舒而坦眼藥水
商品名	Xalatan oph. 0.005% 2.5mL/Bot	Xalacom eye drops 2.5mL/Bot

圖片		
學名規格	Xalacom eye drops 2.5mL/Bot(複方)	Duotrav eye drops 2.5mL/Bot(複方)
中文商品名	複方舒而坦眼藥水	複方舒壓坦點眼液
商品名	Xalacom eye drops 2.5mL/Bot	Duotrav eye drops 2.5mL/Bot

三、藥物安全警訊

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表

(1)Opioid 類成分止痛藥品安全資訊風險溝通表

2025/7/31 美國 FDA 要求鴉片類止痛藥品應更新仿單，強調長期使用之誤用、濫用、成癮及致命和非致命過量等風險，並協助醫療人員及病患理解長期處方鴉片類止痛藥品的風險與效益。

- i. 2 項近期完成的上市後研究(postmarketing requirements [PMR] 3033-1 及 3033-2)為病人長期使用鴉片類止痛藥品之誤用、濫用、成癮、致命和非致命藥品過量風險，提供新的量化資料。
 - a. PMR 3033-1：評估病人開始長期使用第二級(Schedule II)鴉片類止痛藥品的成癮、誤用和濫用風險。資料納入期間為 2017 年至 2021 年，並將病人分為 2 組，在 90 天內多次領取緩釋/長效鴉片類止痛藥品處方者(ER/LA cohort)和領取任何第二級鴉片類止痛藥品處方，90 天中涵蓋至少 70 天者(LtOT cohort)。研究結果顯示，在 12 個月的追蹤期間，2 組中約有 1-6% 的病人新判定符合鴉片類藥品成癮標準、約 9% 的病人新判定符合鴉片類處方藥品濫用標準(如蓄意使用藥品於非治療目的)、約 22% 的病人新判定符合鴉片類處方藥品誤用標準(如為治療目的但不當使用藥品)。這些研究結果中的發生率因病人特性與用藥相關因素而有所差異，然病人的物質濫用史為其中最強力且一致的風險因子。
 - b. PMR 3033-2：評估 2006 至 2016 年間病人新開始長期使用第二級鴉片類止痛藥品，發生鴉片類藥品過量或過量相關死亡(opioid-involved overdose or opioid overdose-related death, OOD)的風險。其中新長期使用定義為，在進入研究前的 3 個月內持有第二級鴉片類藥品處方涵蓋至少 70 天的用量，且在之前 6 個月內未持有過該類藥品處方。研究結果觀察到在不同研究地點間，OOD 的 5 年累積發生率約介於 1.5-4%，而在整體研究期間(5-11 年，依研究地點而異)約有 17% 的首次鴉片類藥品過量事件為致命事件。同樣地，研究結果中的發生率因病人特性與用藥相關因素而異，然較高的鴉片類藥品起始劑量則為 OOD 顯著且一致的風險因子。
- ii. 美國 FDA 經整體性評估後，決議鴉片類止痛藥品仿單應更新資訊摘要如下：
 - 刪除「延長治療期間 (extended treatment period)」的文字，以避免被誤解為有證據支持鴉片類止痛藥品在無限期長期使用下的安全性和有效性。
 - 強調較高劑量與嚴重傷害風險增加相關，且嚴重傷害風險在整個療程中持續存在。

- 新增 PMR 3033-1、PMR 3033-2 研究結果數據和總結。
- 闡明長效或緩釋劑型鴉片類止痛藥品僅應於所有替代療法(包含速放劑型鴉片類藥品)都不足以控制嚴重且持續性疼痛時才可使用。
- 強調對於可能具生理性依賴的病人，不應驟停或快速減低鴉片類藥品劑量，因可能導致嚴重傷害，如戒斷症狀。
- 新增鴉片類藥品過量反轉劑(naloxone 和 nalmefene)相關資訊。
- 在與中樞神經抑制劑藥品交互作用之段落新增 gabapentinoid 類藥品(如 gabapentin、pregabalin)。
- 新增鴉片類藥品過量之中毒性腦白質病變(toxic leukoencephalopathy)風險資訊。
- 修改胃腸道相關警語，新增鴉片類藥品引起之食道功能障礙(opioid-induced esophageal dysfunction, OIED)。

醫療人員應注意事項：

- i. 長期使用鴉片類止痛藥品可能具有誤用、濫用、成癮及過量的風險，處方該類藥品前應謹慎評估病人用藥之風險效益。
- ii. 若病人需使用鴉片類止痛藥品，宜考慮以速放劑型作為需要時使用之第一線治療，並保留緩釋/長效劑型於嚴重且持續性疼痛無法以其他替代治療有效控制時才使用。
- iii. 處方鴉片類止痛藥品時，應依照病人治療目標，開立最低有效劑量和最短用藥天數。由於鴉片類藥品過量的風險隨劑量增加而上升，且整個療程期間皆可能發生嚴重傷害，故調高劑量應保留於病人對較低劑量反應不佳且臨床效益明顯大於其重大風險時。
- iv. 應定期評估病人用藥的風險效益及持續用藥之必要性，並監測病人是否出現成癮、誤用或濫用的徵兆。
- v. 使用鴉片類藥品於可能具生理性依賴的病人時，應避免快速減低劑量或突然停藥，因可能導致嚴重的戒斷症狀、無法控制的疼痛或自殺。
- vi. 應告知病人使用鴉片類藥品可能的嚴重風險及遵照醫囑用藥之重要性；提醒併用酒精、benzodiazepines、或其他中樞神經抑制劑(如 gabapentinoids)時，可能增加鴉片類藥品過量的風險，並衛教病人識別呼吸抑制的症狀和徵象，若出現相關症狀時需立即就醫。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 鴉片類止痛藥品潛在嚴重傷害的風險，包含長期使用可能出現誤用、濫用、成癮、過量甚至導致死亡。就醫時應主動告知醫生您的過去病史、用藥史和疼痛情形，並和醫生討論您的疼痛控制計畫。治療期間，醫生會依您的治療情況定期評估您使用鴉片類止痛藥品的風險效益，請依約回診。

- ii. 較高劑量的鴉片類止痛藥品伴隨較高的過量風險，且治療期間皆可能發生嚴重傷害，請務必遵循醫囑用藥，切勿使用超出醫生開立給您的劑量、擅自增加頻次或延長用藥天數，亦不應在未諮詢專業醫療人員的情況下，快速減低劑量或突然中斷用藥，因可能導致嚴重副作用。
- iii. 使用鴉片類藥品若出現呼吸緩慢、呼吸淺、呼吸困難、嚴重嗜睡、無法正常回應或被喚醒等症狀，此可能為危及生命的情況，請立即尋求醫療協助。另外，在服用鴉片類止痛藥品期間，若疼痛增強、對疼痛更加敏感，或出現新的疼痛，特別是發生在觸摸或其他通常不會引起疼痛的情況(如梳理頭髮)，應主動告知醫師。
- iv. 請將鴉片類止痛藥品存放於孩童或寵物無法接觸的地方，並且不可轉讓他人，誤服或擅自用藥可能導致嚴重傷害甚至死亡。如有未使用的鴉片類管制藥品，請務必依規定繳回。
- v. 如果您對於使用鴉片類止痛藥品有任何疑問或疑慮，請諮詢專業醫療人員。

本院含 opioid 類相關成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IALFENT3	Alfentanil	Alfentanil(0.5mg/mL) 2mL/Amp	阿華吩坦尼注射液
TDESUD81	Desud PLUS SL	Buprenorphine 8mg/Naloxone 2mg/ Tab	解佳益舌下錠
LBUTORP	Butaro	Butorphanol 10mg/mL 2.5mL/Bot	全妥噴鼻液
TCODEIN	Codeine	Codeine phosphate 30mg/Tab	磷酸可待因錠
LFENT2.5	Fentanyl T.dermal	Fentanyl(25mcg/hr)吩咐坦尼 2.5mg/Patch	"管"吩咐坦尼穿皮貼片劑
IFENT3	FENTAnyl "PPCD"	FENTAnyl 【10mL】 /Amp "PPCD" 0.05mg/mL	"管制藥品廠" 吩坦尼 注射液
LFEN122	Fentanyl	Fentanyl 12.5mcg/hr 1.25mg/Patch	12.5 mcg 吩坦尼穿皮貼 片劑
IFENTAN	Fentanyl	Fentanyl(0.05mg/mL) 2mL/Amp	2mL 吩坦尼注射劑
TFENTAN	Painkyl	Fentanyl 200mcg/buccal films	平舒疼口頰溶片
TFENTA1	Fentora buccal	Fentanyl 100mcg/buccal Tab	吩咐妥拉口頰錠
LFENT50	FENTANYL TD Patch	FENTANYL 50mcg/hr 吩坦尼 5mg/Patch	吩咐坦尼穿皮貼片劑
LMETHAD1	Methadone oral	Methadone oral 10mg/mL 1L/Bot	美沙冬濃縮內服液
TNNBMST	MORPHINE (NNB)	MORPHINE SULFATE 30mg/Tab (NNB)	硫酸嗎啡長效膜衣錠
TMORPH2	Morphine	Morphine Sulfate 15mg/Tab	硫酸嗎啡錠 15 毫克
IMORP2	MORPHINE HCl	MORPHINE HCl(大劑量) 20mg/1mL/Amp	鹽酸嗎啡注射液

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IMORPH	Morphine HCl	Morphine HCl(針劑) 10mg/1mL/Amp	鹽酸嗎啡注射液
INALBUP	BAIN	Nalbuphine (芯奔)10mg/mL/Amp	芯奔注射液
INALBU15	Naldebain	Nalbuphine (長效)150mg/2mL/Vial	納疼解長效注射液
TOXYCO2	OxyContin	Oxycodone HCL 持續 20mg/Tab	疼始康定 20 毫克持續藥效錠
TOXYCO5	OxyNorm	OXYCODONE HCL 速效 5mg/Cap	奧諾美 5 毫克速效膠囊
IDEMER1	Pethidine	Meperidine(Pethidine) 50mg/mL/Amp	鹽酸配西汀注射液
IREMIF2	Remifentanil	Remifentanil 2mg/Vial	瑞吩坦尼凍晶乾燥注射劑 2 毫克
TUTRAPHR	Utraphen	Tramadol 37.5 mg/ Acetaminophen 325 mg	立除痛膜衣錠
TTRAMAD	Muaction	Tramadol SR 100mg/Tab	妙而通持續釋放錠

(2) 含 mefenamic acid 成分和 trimethoprim/sulfamethoxazole 複方成分止痛藥品安全資訊風險溝通表

2025/9/12 瑞士 Swissmedic 針對藥品可能引起無菌性腦膜炎(aseptic meningitis)發布警訊，並說明曾接獲使用 mefenamic acid、trimethoprim/sulfamethoxazole (co-trimoxazole)後發生無菌性腦膜炎的不良反應案例。

- 藥品可能是造成無菌性腦膜炎的原因之一，但容易被忽略。有些藥品在使用後可能發生罕見或極罕見的無菌性腦膜炎不良反應，如 ibuprofen、mefenamic acid 或 co-trimoxazole。患有自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡)的病人在使用 NSAIDs 後可能較易發生此不良反應，然其亦可能發生於健康族群。
- 目前藥品造成無菌性腦膜炎的病理生理機轉尚未有明確解釋，尚在討論的可能機制包括免疫性過敏反應(第 III/IV 型)、及 co-trimoxazole 與 IVIG 藥品對腦膜的直接化學性刺激等。
- 瑞士 Swissmedic 曾接獲使用 mefenamic acid、co-trimoxazole 後發生無菌性腦膜炎的不良反應案例。藥品引起的無菌性腦膜炎，症狀一般會在初次暴露藥品後的數小時或數日內發生，或於再次暴露後的數分鐘至數小時內出現。停藥後症狀通常可以迅速緩解且無併發症。

醫療人員應注意事項：

- 曾有使用 mefenamic acid 或 co-trimoxazole 後發生罕見的無菌性腦膜炎之案例報告。患有自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡)的病人在使用 NSAIDs 後可能較容易發生此不良反應，但亦可能發生於健康族群。

- ii. 藥品引起的無菌性腦膜炎，症狀一般會在初次暴露藥品後的數小時或數日內發生，或於再次暴露後的數分鐘至數小時內出現。停藥後症狀通常可以迅速緩解且無併發症。
- iii. 藥品可能是造成無菌性腦膜炎的原因之一，但容易被忽略。若病人出現典型腦膜炎症狀且於近期曾使用可疑藥品，在鑑別診斷時應考慮無菌性腦膜炎之可能性。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 本院無含 mefenamic acid 成分藥品成分之藥品。
- ii. 腦膜炎主要分成感染性及非感染性(又稱為無菌性腦膜炎)。除了涉及腦膜相關的系統性疾病外，藥品也可能是導致無菌性腦膜炎的原因之一。
- iii. 藥品引起的無菌性腦膜炎很罕見，通常在初次用藥後的數小時或數日內發生，或於再次用藥的數分鐘至數小時內出現。若您於用藥期間出現疑似腦膜炎相關症狀，如高燒、劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵直等，請立即尋求醫療協助。
- iv. 若對於用藥有任何的疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。

本院含 trimethoprim/sulfamethoxazole 複方成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
LSULFAC	Sulfacotrim susp	Sulfamethoxazole 40mg/Trimethoprim 8mg/mL	沙法克寧懸浮液劑
ISEPTRI	Sevatrim	Sulfamethoxazole 400 mg/Trimethoprim 80mg/Amp	雪白淨注射液
TBAKTAR	Baktar	Sulfamethoxazole 400 mg/Trimethoprim 80mg/Tab	撲菌特錠