

品項查詢

英文名稱

(商品名)

醫令代碼

健保代碼

許可證字號

成份及含量

(學名)

藥品類別

藥廠名稱

作用(適應症)

用藥方法(請依

藥袋指示服用)

副作用

禁忌及其他注意

事項

藥品如何存放

忘記服藥時怎麼

辦

Permethrin 5% w/w 60g/Tube

OPERME62

BC28575351

衛部藥輸字第028575號

Permethrin 5% w/w 60g/Tube “松林”滅疥乳膏

外用藥

捷昇生技醫藥有限公司 / 捷昇生技醫藥有

疥瘡

1.原則上單次治療即可。應在8至14小時後再洗去乳膏。2.先洗完澡後，全身擦乾，再等60分鐘後，體溫恢復正常，再抹藥物。3.請從頸部開始往下塗抹全身患處，塗抹薄薄一層即可，指甲內也需塗抹上此藥，須經8-14小時後方可洗去(最佳使用時間為晚上睡覺前)。4.若您需幫別人塗抹藥品，請戴上塑膠或橡膠材質的手套再行塗抹，塗抹完後請徹底洗淨雙手。5.如仍需要，請在醫師指示下，一週後再塗抹藥物1次。

1.請勿在熱水浴後立即使用，此時容易有副作用發生；塗擦後8-12小時再洗去。2.使用後可能有局部不適、灼熱、麻木，皮膚刺痛、瘙癢。3.治療14天後，觀察到疥蟲表示需要重

新治療。4.可能對眼睛有輕微刺激。應建議病人在使用過程中避免接觸眼睛。

請存放於室溫以下、乾燥處；避免放在孩童容易取得的地方。

此藥物治療通常使用一次即可。若有復發請諮詢醫師。

中文名稱

“松林”滅疥乳膏

藥品外觀



中文外觀說明

仿單下載



一種藥物具有多種臨床用途，非經醫師診斷或藥師調劑請勿自行用藥。

欲了解本藥詳細資料，請與藥劑部諮詢專線聯絡。

*** 總/分院聯絡電話：<https://www.cmuh.cmu.edu.tw/Contact>